Aliette® WDG

Fungicida / Gránulos dispersables

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
Fosetil-al

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	**% en peso**
Fosetil-Al: tris(etil fosfonato) de aluminio	80.00
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)	
Ingredientes inertes:	
Diluyentes, humectantes y dispersantes	20.00
TOTAL	**100.00**

Categoría toxicológica:
5 Precaución

No. de Registro:
RSCO-FUNG-0347-304-034-080

Descripción:
Aliette® WDG es un fungicida de acción sistémica ascendente y descendente, en gránulos dispersables en agua que se aplica en forma de aspersión con cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo. Este producto controla las enfermedades en los cultivos que se indican en la siguiente tabla de usos.

USOS

Cultivo	Enfermedad	Dosis/ha	Técnicas de tratamiento
Cebolla (7)	Mildiu *Peronospora destructor*	2.0 –2.5 kg	Inicie el tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y repítase cada 5 días si éstas persisten.
Limón Naranja Toronja (1)	Gomosis *Phytophthora parasitica*	2.5 kg a) 2.5 kg b) 500 g/L de caldo	**Tratamiento preventivo:** aspersión foliar, 4 aplicaciones por ciclo. 1a. Brotación 2a. 3 meses después 3a. 3 meses después 4a. 3 meses después. **Tratamiento curativo:** a) Cada mes misma dosis. b) Si el ataque es muy severo se hace aplicación en la herida previamente descortezada.

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los productos agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario deberá cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), tiempos de espera y residuos. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico de la región.

Piña (90)	Pudrición del corazón *Phytophthora parasitica* *P. cinnamomi*	250 g/L de agua	Remojo de los esquejes o coronas antes de la plantación por lo menos 10 minutos. Aspersión foliar cada 2 o 3 meses hasta la inducción floral.
Papa (14)	Tizón tardío *Phytophthora infestans*	2.5 kg	Inicie el tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y repítanse cada 5 días si éstas persisten.
Jitomate (Tomate) (14)	Tizón tardío *Phytophthora infestans*	2.5 kg	Inicie el tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y repítanse cada 7 días si éstas persisten.
Aguacate (30)	Tristeza del aguacatero *Phytophthora cinnamomi*	150 g/40 L de agua 4 kg	**Árboles de vivero:** aplicar 1 L de la solución en cada bolsa de 2 a 3 días antes del trasplante. **Tratamiento preventivo:** aspersión foliar, 4 aplicaciones por ciclo. 1a. Mayo antes de las lluvias; 2a. fines de Julio; 3a. Septiembre / Octubre; 4a. Marzo
Tabaco (0)	Pie negro *Phytophthora parasitica* Moho azul *Peronospora tabacina*	2.5 kg	Aspersión foliar cada 8 días y en ataques severos cada 5 días.
Melón Pepino Calabacita Calabaza Sandía (0)	Mildiu *Peronospora cubensis*	2.5 kg	Hacer tratamiento preventivo. Aspersión foliar cada 8 días. Iniciar tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Fresa (0)	Pudrición del fruto *Phytophthora* sp	2.5 kg	Hacer tratamiento preventivo. Iniciar tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicar cada 8 a 10 días dependiendo de las condiciones climáticas.
Rosa	Mildiú *Peronospora sparsa*	1.5 – 2.0 kg	Iniciar tratamiento tan pronto se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar dos aplicaciones cada 7 días.

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los productos agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario deberá cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), tiempos de espera y residuos. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico de la región.

Frambuesa Arándano Fresa Grosella Zarzamora (60)	Pudrición de raíces *Phytophthora fragarie*	2-3 kg	Al momento del trasplante, aplicar en banda por ambos lados de la planta usando un volumen de agua de 500 litros por hectárea. Realizar dos aplicaciones al suelo, por ambos lados de la planta, a intervalo de 14 días.
		80 – 100 g/L de agua	Inmersión de las raíces antes de la plantación por lo menos 5 minutos.
Chile Chile habanero Pimiento (5)	Marchitez *Phytophtora capsici*	2 – 2.5 Kg	Aspersión foliar 7 días después del trasplante de forma preventiva y repetir a los 7 días.
Papaya (120)	Pythium *Phytophtora sp*	250 – 350 g/100L	Realizar una primera aplicación homogénea y dirigida al suelo, ésta debe ser al momento de la siembra, una vez que la semilla se encuentre sembrada y tapada. Realizar una segunda aplicación a los 30 días en aspersión total.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 12 horas.
( ) I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha

PRESENTACIONES DISPONIBLES

2 Kg

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los productos agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario deberá cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), tiempos de espera y residuos. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico de la región.