Cupravit®

Fungicida / Polvo humectable

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
Oxicloruro de cobre

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	**% en peso**
Oxicloruro de cobre, con un contenido de cobre metálico como elemento No menor de 59%.....85.00 (Equivalente a 500 g de i.a./kg)	
Ingredientes inertes: Diluyente, humectante y dispersante.....15.00	
TOTAL	**100.00**

Categoría toxicológica:
5 Precaución

No. de Registro:
RACO-FUNG-0328-007-002-085

USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Kg/ha
	Nombre común	Nombre científico	
Aguacatero	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporoides*	400 a 450 g/100 L de agua
	Roña	*Sphaceloma perseae*	
	Mancha de la hoja	*Cercospora purpurea*	
Ajonjolí	Mancha de la hoja	*Cercospora personata*	3.0 a 4.0
Apio	Mancha foliar	*Cercospora appii*	3.0 a 4.0
	Tizón foliar	*Septoria apii*	
Berenjena	Tizón temprano	*Alternaria solani*	3.0 a 3.5
	Antracnosis	*Colletotrichum phomoides*	
Brócoli Col Coliflor Col de Bruselas	Mildiu	*Pernospora parasitica*	3.0 a 3.5

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y las tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar a su exportador o importador antes de aplicarlo.

Cacao	Pudrición negra	*Phytophthora palmivora*	500 a 600 g/100 L de agua
	Pudrición morena	*Diplodia theobromae*	
	Mal de hilachas	*Corticium koleroga*	
	Antracnosis	*Colletotrichum sp.*	
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía	Mildiu	*Pseudoperonospora cubensis*	3.0 a 4.0
	Antracnosis	*Colletotrichum lagenarium*	
	Mancha de la hoja	*Alternaria cucumerina*	
Cafeto	Mal de hilachas	*Corticium koleroga*	500 a 600 g/100 L de agua
	Mal de hierro	*Cercospora coffeicola*	
	Mal rosado	*Corticium salmonicolor*	
	Ojo de gallo	*Mycena citricolor*	
	Roya	*Hermileia vastatrix*	
Cebolla	Mancha púrpura	*Alternaria porri*	3.0 a 3.5
	Mildiu	*Peronospora destructor*	
Cempasúchil	Mildiu	*Plasmopara tagetes*	3.0
Chícharo	Antracnosis	*Colletotrichum sp.*	3.5 a 4.0
Chile	Antracnosis	*Colletotrichum capsici*	4.0 a 4.5
	Tizón temprano	*Alternaria solani*	
	Mancha foliar	*Cercospora capsici*	
Durazno	Verrucosis	*Taphrina deformans*	400 a 450 g/100 L de agua
	Tiro de munición	*Coryneum beijerinckii*	
	Roya o Chahuixtle	*Tranzchelia discolor*	
Fresa	Mancha o peca de la hoja	*Mycosphaerella fragariae*	3.0 a 3.5
Frijol Frijol ejotero	Chahuixtle	*Uromyces appendiculatus*	3.0 a 3.5
	Antracnosis	*Colletotrichum lindemuthianum*	
Guayabo	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	400 a 500 g/100 L de agua
	Mancha de clavo	*Pestalotia psidii*	

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y las tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar a su exportador o importador antes de aplicarlo.

Tomate o Jitomate	Tizón temprano	*Alternaria solani*	3.5
	Tizón tardío	*Phytophthora infestans*	
	Tizón gris	*Stemphylium solani*	
	Moho de la hoja	*Cladosporium fulvum*	
Lima Limonero Naranjo Toronjo	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	400 a 500 g/100 L de agua
	Roña del fruto	*Diaporthe citri*	
	Fumangina	*Capnodium citri*	
	Roña	*Elsinoe fawcetti*	
	Gomosis	*Phytophthora* sp	
	Mancha grasienta	*Mycosphaerella citri*	
Mango	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	500 g/100 L de agua
	Roña del fruto	*Elsinoe mangiferae*	
	Fumagina	*Capnodium sp.*	
	Mancha de la hoja	*Pestalotia sp.*	
Manzano Peral	Cenicilla	*Podosphaerea leucotricha*	400 a 500 g/100 L de agua
	Roña	*Venturia inaequalis (manzano)*	
	Roña	*Venturia pirina (peral)*	
	Pudrición amarga	*Glomerella cingulate*	
	Pudrición negra	*Sphaeropsis sp.*	
Nogal	Mancha café de la hoja	*Cercospora fusca*	500 g/100 L de agua
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	4.0 a 4.5
	Tizón tardío	*Phytophthora infestans*	
Papayo	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	450 g/100 L de agua
Plátano	Chamusco	*Mycosphaerella musicola*	400 g/100 L de agua

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y las tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar a su exportador o importador antes de aplicarlo.

Vid	Mildiú velloso	*Plasmopara viticola*	4.0
	Antracnosis	*Elsinoe ampelina*	
	Cenicilla	*Uncinula necator*	
Tabaco	Tizón tardío	*Phytophthora infestans*	3.5 a 4.0
	Ojo de rana	*Cercospora nicotianae*	
	Moho azul	*Peronospora tabacina*	

Producto exento de tolerancia de residuos e intervalo de seguridad SIN LÍMITE.
Tiempo de reentrada al área aplicada: 4 horas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y las tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar a su exportador o importador antes de aplicarlo.