

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

### Datos Generales del Producto

Producto	<b>CUPROFIX DISPERSS</b>
Nombre común	Mancozeb + Sulfato cuprocálcico
Nombre químico	Mancozeb: Producto de coordinación del ión Zinc y etilen bis ditiocarbamato de manganeso Sulfato cuprocálcico: Con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 26%
Concentración	Mancozeb: 30.00% Equivalente a 300 g de i.a./kg Sulfato cuprocálcico: 47.00% equivalente a 122 g de i.a./kg
Tipo de formulación	Gránulos dispersables
Función	Fungicida agrícolas
Grupo químico	Mancozeb: Dltiocarbamatos Sulfato cuprocálcico: Elemento metálico
Modo de acción	Mancozeb: Contacto, multisitio, protectante. Sulfato cuprocálcico: Contacto y protectante
Registro	RSCO-MEZC-1387-301-034-077
Precauciones especiales	Nocivo si se inhala

### Usos

CUPROFIX DISPERSS es un fungicida de contacto con acción protectora a base de Mancozeb y Sulfato cuprocálcico para el control de las enfermedades en los siguientes cultivos:

Cultivos	Enfermedad		Dosis kg / ha
	Nombre común	Nombre científico	
Jitomate (7)	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.5
Pepino (7)	Tizón temprano	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.6

Papa (5)	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	3.0 - 3.5
Melón (5)	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	3.0 - 3.5
Calabacita (5)	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	3.0 - 3.5

( ) Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de haber aplicado el producto.

### Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo y aplicación de CUPROFIX DISPERS es siempre utilice su equipo de protección personal. Para la aplicación de CUPROFIX DISPERS es factible utilizar equipos convencionales de aplicación, vierta el producto lentamente en la cantidad de agua necesaria con agitación constante. Todas las partículas de CUPROFIX DISPERS formarán una suspensión.

### Signos y síntomas de intoxicación

Puede provocar malestar estomacal, vómito y diarrea. Irritación y molestias en la piel o comezón. Lagrimeo de ojos, molestias y visión borrosa.

### Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico, por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión administrar carbón medicinal (3 a 5 cucharadas en medio litro de agua).